Gestion du couvert pour la disponibilité de la ressource en eau potable ; modèles de bilans hydriques

André Granier ¹, Julien Figuepron ² et Vincent Badeau ¹

¹ INRA Centre de Nancy,
UMR INRA UHP Ecologie et Ecophysiologie Forestières
54280 CHAMPENOUX

² CNPF - IDF
Maison de la Forêt
11, rue de la Commanderie
54000 Nancy

Plan

- **bilan hydrique : bases et définitions**
- **facteurs de variation du bilan hydrique : climat et interfaces**
- **approche de modélisation**
- **application à l'eau potable**
- **conclusions**

Introduction

Quelques idées reçues

- la forêt fait pleuvoir : **NON OUI**
- la forêt produit de l'eau : 1) en quantité **NON**
2) en qualité **OUI**
- la forêt favorise le drainage vers le sous-sol : **OUI**

Nos objectifs opérationnels

Gestion du couvert forestier / alimentation en eau potable

- évaluer le drainage vers les nappes et les exutoires (sources) de massifs forestiers
- analyser l'influence de la nature et de la structure de la couverture forestière, donc de la gestion, sur le flux de drainage

Bilans Hydriques

- bases et définitions
- facteurs de variation du bilan

Bilan hydrique : de quoi parle-t-on ?

Bilan hydrologique

Bilan hydrique

Interception des précipitations : une caractéristique majeure des peuplements forestiers

Un couvert forestier régule sa consommation d'eau selon la disponibilité de l'eau

forêt de Hesse 2002-2003

La transpiration des arbres : le flux quantitativement le plus important, qui dépend du climat (ici relativement à l'ETP) et de l'indice foliaire du peuplement. (D'après Bréda et Granier)

LAI : Leaf Area Index ou indice foliaire (m² de feuilles / m² de sol)

Forêts vs. prairies et cultures

Granier A, programme Carboeurope IP (6th PCRD)

Cohérence avec les mesures d'écoulements de bassins versants

D'après C. Cosandey (2000) « Hydrologie continentale : rôle de la végétation »

Spécificités de l'interface sol-racines

sources : Blanchart et al. (2000) et Granier et al.

Biomasse racinaire

Porosité

cultures

jachère

prairies

forêt

cultures

jachère

prairies

forêt

Modélisation de Bilans Hydriques

- le modèle Biljou[©]
- application à l'eau potable

Biljou[©], un modèle de bilan hydrique

- conçu pour le diagnostic, la prévision
- au départ, pour relier la croissance radiale des arbres au déficit hydrique
- dans cette étude : simulation des flux de drainage

Bréda 1995 (thèse),
Granier et al., 1999 (Ecological Modelling)

Validation du modèle

ENTREES

pluie

Climat journalier

ETP :

rayonnement global
déficit d'aturation
température
vent

PARAMETRES

couvert :
indice foliaire

réserve utile

données clim.

MODELE

fonctions calibrées

transpiration
pluie sol
phénologie
déficit hydrique

contenu en eau sol

SORTIES

réserve du sol extractible

flux journaliers :
transpiration, évapotranspiration, P_{sol}
drainage

indices de stress
(régulation des flux)

Application à l'eau potable : choix de 2 sites forestiers

Influence du type de couvert sur les volumes drainés

- Constat : la production des sources est limitante en période d'étiage
- Affirmation générale : la recharge des nappes s'effectue hors période de végétation.
- Question : Quel rôle pourrait jouer le type de couvert sur les volumes drainés au moment où la ressource est la plus limitante ?

1. La commune de Masevaux : mélange de feuillus (45%) et de résineux (55%), site bien arrosé du sud des Vosges. Dispose de sources captées avec données journalières de volumes.
2. La FD de Hesse, hêtraie de plaine (57).

Hypothèses des simulations de bilan hydrique

Même réserve utile du sol = 130 mm (hypothèse moyenne)

5 hypothèses de couverts forestiers (*LAI ou indice foliaire*) :

- feuillus à fort LAI (maxi = 7.5)
- feuillus à LAI moyen (maxi = 4)
- feuillus à LAI faible (maxi = 3)
- résineux à fort LAI (maxi = 7.5)
- mélange résineux - feuillus (LAI varie entre 4 et 7.5)

Présentation des résultats 1) Masevaux

Période de végétation
(1^{er} avril au 15 octobre)

Période d'étéage
(1^{er} juillet au 31 août)

Choix de 3 années contrastées : sèche, moyenne et humide Montagne - Masevaux

Différentiel de drainage entre résineux/feuillus faible LAI : en moyenne 6,9 m^3/ha
pour un BAC de 200 ha : représente potentiellement la consommation de 9200
habitants

Choix de 3 années contrastées : sèche, moyenne et humide Plaine : F.D. Hesse

Différentiel de drainage entre résineux/feuillus faible LAI : en moyenne 1,9 m³/ha/j en période d'été

Hesse : drainages sur la période 1er avril au 15 octobre

Différentiel de drainage entre résineux/feuillus faible LAI : en moyenne 4.3 m³/ha/j en période de végétation

Conclusion

- **Cycle de l'eau : des variations entre espèces, mais les effets prépondérants restent le climat et le l'indice foliaire**
- **Pour la production d'eau potable, le maintien de couverts forestiers clairs, pourrait générer des économies en termes de coûts de fonctionnement, avec l'optimisation de la production de sources gravitaires (Lorraine)**
- **La modélisation de bilans hydriques fournit des arguments quant aux services que peut rendre la forêt sur le plan de la disponibilité de la ressource en eau**
- **Perspectives : simulations en climat + sec, type méditerranéen**

Merci de votre attention !